

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : Necitumumab + CDDP + GEM(二外)

レジメン説明 : 2020/9/8承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)ポーターザ点滴静注液800mg 50mL	800mg		800mg
07	点滴静注	(化)ケムシホリン点滴静注用「ヤルト」※	1000mg/m2		1050mg/m2
09	点滴静注	(化)シブチン点滴静注「マルコ」※	75mg/m2		78.75mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 9.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ソルゲム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	ソルゲム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ポーターザ点滴静注液800mg 50mL 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 200mL		投与順 4						
05	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注:	150mg 100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : Necitumumab + CDDP + GEM(二外)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ アロキン静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL		投与順 6						
07	点滴静注	(化)ゲムシリン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 7						
08	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL		投与順 8						
09	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 9						
10	点滴静注	ソルデムA1 輸液500mL KCL注20mgEqキット「テルモ」 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10 投与順11						
11	点滴静注	ソルデムA3A 輸液500mL 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			2回	2回				
12	点滴静注 <次ページあり>	デキスト注射液(デカトロン後発)※	6.6mg			1回	1回	1回			

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : Necitumumab + CDDP + GEM(二外)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8							
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 9.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL									
02	点滴静注	ソルテ [®] A1 輸液500mL KICL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL									
03	点滴静注	ソルテ [®] A1 輸液500mL KICL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL									
04	点滴静注	(化)ポートラーザ [®] 点滴静注液800mg 50mL 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 200mL		投与順 2							
05	点滴静注	プロイメント [®] 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL									
06	点滴静注	デキスト [®] 注射液(デカ [®] ロン後発)※ アロキ [®] 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL									
07	点滴静注 <次ページあり>	(化)ゲムシタビ [®] ン点滴静注用「ヤルト」※	0mg		投与順 4							

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : Necitumumab + CDDP + GEM(二外)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8							
		生食溶解液 100mL キットH 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL									
08	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL									
09	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL									
10	点滴静注	ソルゲムA1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL									
11	点滴静注	ソルゲムA3A 輸液500mL 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL									
12	点滴静注	テキサト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	6.6mg 100mL		投与順 3							
13	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Necitumumab + CDDP + GEM(二外) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : Necitumumab + CDDP + GEM(二外)

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	生食200mLにポトラーザを加えること
13	ルートキープ