

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL								
02	点滴静注	プロイント®点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL								
03	点滴静注	パロセトロン(アロキシル後発)静注0.75mg/5mL「タイウ」 デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL								
04	点滴静注	(化)オプジーボ®点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL								
05	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL								
06	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL プロボトル 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL								
07	点滴静注	(化)アリムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM	0mg 100mL								
	<次ページあり>										

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	パロセトロン(アロキシル後発) 静注0.75mg/5mL 「タイセ」 デキスト注射液(デカロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL								
06	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL								
07	点滴静注	(化)アリムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM	0mg 100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 42 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22						
		点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1									
08	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22µmのフィルター使用
05	サト投与後からヤボ開始までの30分間インターバル用
06	0.2~1.2µmのフィルター使用 終濃度 : 1~4mg/mL (25kg未満は生食量を調整すること)