

第2外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM

レジメン説明 : 2021/1/8承認

適用条件 :

除外条件 :

本表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)オプジーボ 点滴静注※	360mg		360mg
08	点滴静注	(化)ヤーボイ 点滴静注液50mg 10mL	1mg/kg		1.05mg/kg
09	点滴静注	(化)アリム注射用※	500mg/m2		525mg/m2
11	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	75mg/m2		78.75mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	カルテミ 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	カルテミ 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	プロイマド 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	パロセトン(アキオン後発) 静注0.75mg/5mL 「タイ秒」 デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 5						
<次ページあり>											

第2外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
		療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
08	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL								
09	点滴静注	(化)アリク注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL								
10	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL								
11	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバグ「テルモ」 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL								
12	点滴静注	ウルテムI 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL								
13	点滴静注	ウルテムI 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で	500mL 10mL								
	<次ページあり>										

第2外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
		療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
08	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL								
09	点滴静注	(化)アリム注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL								
10	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL								
11	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL								
12	点滴静注	カルデムI 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL								
13	点滴静注	カルデムI 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で	500mL 10mL								
	<次ページあり>										

第2外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22	Day23	Day24	Day25			
		療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
08	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL								
09	点滴静注	(化)アリム注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 7						
10	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL		投与順 8						
11	点滴静注	(化)シブチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 9						
12	点滴静注	ソルゲムA1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10						
13	点滴静注	ソルゲムA1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で	500mL 10mL		投与順11						
	<次ページあり>										

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22	Day23	Day24	Day25			
		投与経路:末梢サブルート1									
14	点滴静注	デキスト注射液(デキストン後発)※ 生食溶解液 100mL キット 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	6.6mg 100mL			投与順 1	投与順 1	投与順 1			
15	点滴静注	ルテム3A 輸液500mL 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			投与順 2 投与順 3	投与順 2 投与順 3				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
06	0.2又は0.22µmのフィルター使用
07	オプジーボ 投与後からヤホイ開始までの30分間インターバル用
08	0.2~1.2µmのフィルター使用 終濃度 : 1~4mg/mL (25kg未満は生食量を調整すること)