

【免疫チェックポイント阻害レジメン名称: Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】

レジメン説明: 2021/11/12承認

適用条件:

除外条件:

表面積計算式: 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

IC計算式: 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

IP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)キイトルダ点滴静注※	200mg		200mg
04	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」※	1000mg/m ²		1050mg/m ²
05	点滴静注	(化)カホプラチン点滴静注液「サト」※	2(AUC)		900mg

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 150分で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)キイトルダ点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	グラネトロン静注液3mg「NK」 3mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)カホプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注:	0mg 250mL		投与順 5						
<次ページあり>											

※二外科 【免疫チェックポイント阻害レジメン名称 : Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
1	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 150分で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL								
2	点滴静注	(化)キイトルダ点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL								
3	点滴静注	グレースロン静注液3mg「NK」 3mL デキスト注射液(デキストロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 100mL								
4	点滴静注	(化)ゲムタビン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
5	点滴静注	(化)カボプライン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
6	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
7	点滴静注	グレースロン静注液3mg「NK」 3mL デキスト注射液(デキストロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH	3mg 3.3mg 100mL		投与順 2						
	<次ページあり>										

二外科 【免疫チェックポイント阻害レジメン名称 : Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		療法名:Pembrolizumab+GEM+CBDCA 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									

IP	オーダーコメント
1	ルートキープ
2	0.2~5μmのフィルター使用
6	ルートキープ