

e: 1/4 期間: Day1~Day7

インターバル日数: 21日 基準日: Day 1

二外科 【ICI+chemo (Sq)】 レジメン名称: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM

レジメン説明: 2021/1/8承認

目的条件:

副作用条件:

表面積計算式: 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

計算式: 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
点滴静注	(化)オプジーボ 点滴静注※	360mg		360mg
点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※	1000mg/m2		1050mg/m2
点滴静注	(化)カボプロチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
点滴静注	プロイント 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
点滴静注	パロリトロン(アキチン後発) 静注0.75mg/5mL 「タイホ」 デキスト注射液(デキトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
点滴静注	(化)オプジーボ 点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注:	0mg 100mL		投与順 5						

【ICI+chemo (Sq)】 レジメン名称: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8							
1	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	250mL									
2	点滴静注	プロピント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	150mg 100mL									
3	点滴静注	パロリトン(アキシ後発) 静注0.75mg/5mL 「タイホ」 デキサト注射液(デカト後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL									
4	点滴静注	(化)オプジーホ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 100mL									
15	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3							
16	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サド」※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 250mL									
17	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM	100mL		投与順 1							
	<次ページあり>											

外科 【ICI+chemo (Sq)】 レジメン名称 : Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1									
08	点滴静注	デキスト注射液(デキストン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22µmのフィルター使用
07	ルートキープ