

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + PEM

レジメン説明 : 2021/1/8承認

適用条件 :

除外条件 :

体表積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

JP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※	360mg		360mg
05	点滴静注	(化)アリム注射用※	500mg/m2		525mg/m2
06	点滴静注	(化)カホプチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

JP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1							
02	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2							
03	点滴静注	パロセトロン(アキシ後発)静注0.75mg/5mL「タイバ」 デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3							
04	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4							
05	点滴静注	(化)アリム注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + PEM 点滴静注: <次ページあり>	0mg 100mL		投与順 5							

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		*点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22µmのフィルター使用