

育二外科 【ICI+chemo (Sq)】 レジメン名称 : Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM

レジメン説明 : 2021/1/8承認

適用条件 :

除外条件 :

本表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
36	点滴静注	(化)オプジーボ [®] 点滴静注※	360mg		360mg
37	点滴静注	(化)ゲムタビ [®] 点滴静注用「ヤルト」※	1000mg/m2		1050mg/m2
39	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	75mg/m2		78.75mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 9時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	カルテ [®] M1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	カルテ [®] M1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	プロイソ [®] 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	パロセトロン(アロキ [®] 後発)静注0.75mg/5mL 「タイホ」 デキスト [®] 注射液(デカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM <次ページあり>	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 5						

等二外科 【ICI+chemo (Sq)】 レジメン名称 : Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 9時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL								
02	点滴静注	ソルテ TM M1 輸液500mL K C L 注20mEqキット「テル」 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL								
03	点滴静注	ソルテ TM M1 輸液500mL K C L 注20mEqキット「テル」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL								
04	点滴静注	ブライント TM 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL								
05	点滴静注	パロヒトン(アキシ後発) 静注0.75mg/5mL 「タイ」 デキスト注射液(デカト TM 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL								
06	点滴静注	(化)オゾゾ TM 点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL								
07	点滴静注 <次ページあり>	(化)ゲムシビ TM 点滴静注用「ヤクト」※	0mg		投与順 3						

第二外科 【ICI+chemo (Sq)】 レジメン名称 : Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL								
18	点滴静注	20%マニトール注射液「YD」 300mL 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL								
19	点滴静注	(化)シス ^テ チン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバ ^{ック} 「テルモ」 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL								
0	点滴静注	カルテ ^ム A1 輸液500mL K C L 注20mEqキット「テルモ」 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL								
1	点滴静注	カルテ ^ム A1 輸液500mL K C L 注20mEqキット「テルモ」 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL								
2	点滴静注	カルテ ^ム A3A 輸液500mL 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
3	点滴静注	テ ^キ キート注射液(テ ^カ ト ^ン 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で	6.6mg 100mL								
	<次ページあり>										

第二外科 【ICI+chemo (Sq)】 レジメン名称 : Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		投与経路:末梢ルートメイン1									
4	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
15	点滴静注	デキスト注射液(デカロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						

IP	オーダーコメント
01	ルートキープ
06	0.2又は0.22µmのフィルター使用
14	ルートキープ