

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Nivolumab 【360mg】 + CDDP + PEM

レジメン説明 : 2021/1/8承認

適用条件 :

除外条件 :

※表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※	360mg		360mg
07	点滴静注	(化)アリム注射用※	500mg/m2		525mg/m2
09	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	75mg/m2		78.75mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4				
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 9時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1							
02	点滴静注	リテムル 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2							
03	点滴静注	リテムル 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3							
04	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4							
05	点滴静注	パロリセトロン(アロキシ後発)静注0.75mg/5mL 「タイセ」 デキスト注射液(アロキシ後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + PEM	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 5							
<p><次ページあり></p>												

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Nivolumab 【360mg】 + CDDP + PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
12	点滴静注	カルテ [®] A3A 輸液500mL 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			2回	2回				
13	点滴静注	テキサト注射液(テキサト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CDDP + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	6.6mg 100mL			1回	1回	1回			

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
06	0.2又は0.22µmのフィルター使用