

第二外科 【ICI+chemo (Non Sqレジメン名称 : Nivolumab 【360mg】 + PEM維持

レジメン説明 : 2021/1/8承認

適用条件 :

除外条件 :

体表積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※	360mg		360mg
04	点滴静注	(化)アリム注射用※	500mg/m2		525mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + PEM維持 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	デキサト注射液(デカドロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + PEM維持 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2								
03	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + PEM維持 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)アリム注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + PEM維持 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22 μmのフィルター使用