

第2外科

レジメン名称 : S-1+CDDP 【イント[®]内服】 2外

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 : <S-1>

- ★80mg/m2/日を1日2回に分けて服用
- ★3週投与→2週休薬

除外条件 :

表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

IP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
15	点滴静注	(化)シス [®] チン点滴静注「マルコ」※	60mg/m2		65mg/m2

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
11	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:S-1+CDDP 【イント [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 8時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
12	点滴静注	カルテ [®] M1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:S-1+CDDP 【イント [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
13	点滴静注	カルテ [®] M1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:S-1+CDDP 【イント [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
14	点滴静注	デキスト注射液(デカト [®] ン後発)※ パロセト [®] ン(アロキ [®] 後発)静注0.75mg/5mL 「クイカ」 生食溶解液 100mL キットH 療法名:S-1+CDDP 【イント [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL		投与順 4						
15	点滴静注	(化)シス [®] チン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:S-1+CDDP 【イント [®] 内服】 2外 <次ページあり>	0mg 300mL		投与順 5						

育二外科

レジメン名称 : S-1+CDDP 【イムト[®]内服】 2外

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	20%マニトール注射液「YD」 300mL 療法名:S-1+CDDP 【イムト [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL		投与順 6						
07	点滴静注	リデ [®] Δ1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:S-1+CDDP 【イムト [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 7						
08	点滴静注	リデ [®] Δ1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:S-1+CDDP 【イムト [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 8						
09	点滴静注	デキ [®] ト注射液(デカ [®] ト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:S-1+CDDP 【イムト [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL			1回	1回	1回			
10	点滴静注	リデ [®] Δ3A 輸液500mL 療法名:S-1+CDDP 【イムト [®] 内服】 2外 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			2回	2回				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	CDDPの投与前30分