

ge: 1/1 期間: Day1~Day1

インターバル日数: 14日 基準日: Day 1

二外科

レジメン名称: NSCLC ラムシルマブ + エルロチニブ 併用療法

レジメン説明: 2021/1/8 承認

服用条件: タルセバ錠150mg 1日1回 連日内服

注外条件:

表面積計算式: 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

IC計算式: 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

IP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)サイラムサ [®] 点滴静注液※	10mg/kg		10.5mg/kg

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: NSCLC ラムシルマブ + エルロチニブ 併用療法 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路: 末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカト [®] 後発)※ ホ [®] ラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プ [®] ラボトル 療法名: NSCLC ラムシルマブ + エルロチニブ 併用療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	6.6mg 5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)サイラムサ [®] 点滴静注液※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名: NSCLC ラムシルマブ + エルロチニブ 併用療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	・ 0.2又は0.22μmのフィルターを通すこと ・ 全量250mL ・ 忍容性がよければ2回目以降30分まで短縮可