

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科 【MSI-High】

レジメン名称 : Nivo+Ipi 療法 【大腸MSI-H】 (1~4回目)

レジメン説明 : 2020/11/10承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)オゾギホ点滴静注※	240mg		240mg
05	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL	1mg/kg		1.05mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトック 療法名:Nivo+Ipi 療法 【大腸MSI-H】 (1~4回目) 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ボラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Nivo+Ipi 療法 【大腸MSI-H】 (1~4回目) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)オゾギホ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivo+Ipi 療法 【大腸MSI-H】 (1~4回目) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Nivo+Ipi 療法 【大腸MSI-H】 (1~4回目) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	50mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Nivo+Ipi 療法 【大腸MSI-H】 (1~4回目) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL		投与順 5						

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科 【MSI-High】

レジメン名称 : Nivo+Ipi 療法 【大腸MSI-H】 (1~4回目)

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22 $\mu$ mのフィルター使用
04	オプジーホ終了後30分かけて投与 (ヤホイ開始までの30分の観察期間用)
05	0.2~1.2 $\mu$ mのフィルター使用 最終濃度 : 1~4mg/mL

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科 【MSI-High】 レジメン名称 : Nivo+Ipi 療法 【大腸MSI-H】 (5回目以降)

レジメン説明 : 2020/11/10承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)オゾシホ点滴静注※	240mg		240mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivo+Ipi 療法【大腸MSI-H】 (5回目以降) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	ポラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Nivo+Ipi 療法【大腸MSI-H】 (5回目以降) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)オゾシホ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivo+Ipi 療法【大腸MSI-H】 (5回目以降) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22μmのフィルター使用

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科 【MSI-High】

レジメン名称 : 【q4w】 Nivo+Ipi療法 【大腸MSI-H】 5回以降

レジメン説明 : 2020/11/10承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)オプゾーホ点滴静注※	480mg		480mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【q4w】 Nivo+Ipi療法 【大腸MSI-H】 5回以 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	ホララン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名: 【q4w】 Nivo+Ipi療法 【大腸MSI-H】 5回以 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)オプゾーホ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【q4w】 Nivo+Ipi療法 【大腸MSI-H】 5回以 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22μmのフィルター使用