

第三内科

レジメン名称 : 後)CPT-11+CDDP療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)トポ テン点滴静注※	70mg/m2		80mg/m2
05	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	80mg/m2		90mg/m2
11	点滴静注	(化)トポ テン点滴静注※	70mg/m2		80mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	リルテム3A 輸液500mL 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 8時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		3回	3回	3回				
02	点滴静注	テモセロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」2mL デキサト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 13.2mg 100mL		1回						
03	点滴静注	(化)トポ テン点滴静注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		1回						
04	点滴静注	フィジオ 35輸液 500mL 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL		1回						
05	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 (化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で	500mL 0mg		1回						
<次ページあり>											



## 第三内科

## レジメン名称 : 後)CPT-11+CDDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注	ルテム3A 輸液500mL 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 8時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
02	点滴静注	ラモセロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 13.2mg 100mL								
03	点滴静注	(化)トポテン点滴静注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL								
04	点滴静注	フィンオ 35輸液 500mL 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL								
05	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 (化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 0mg								
06	点滴静注	プリンペラン注射液 10mg 2ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3A 100mL								
07	点滴静注	ラクテック注 500mL ソフトバッグ 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注:	500mL								
	<次ページあり>										



## 第三内科

## レジメン名称 : 後)CPT-11+CDDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15								
01	点滴静注	ルテム3A 輸液500mL 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 8時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL										
02	点滴静注	ラモトリン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 13.2mg 100mL										
03	点滴静注	(化)トポテン点滴静注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL										
04	点滴静注	フィジオ 35輸液 500mL 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL										
05	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 (化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 0mg										
06	点滴静注	プリンペラン注射液 10mg 2ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3A 100mL										
07	点滴静注	ラクテック注 500mL ソフトバッグ 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注:	500mL										
	<次ページあり>												

## 第三内科

## レジメン名称 : 後)CPT-11+CDDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15							
		*点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢サブルート1										
08	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH デキサト注射液(デカトロン後発)※ 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL 13.2mg									
09	点滴静注	フジオ 35輸液 500mL 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL									
10	点滴静注	リモセトン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 6.6mg 100mL		1回							
11	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ソフトバグ (化)トポテン点滴静注※ 療法名:後)CPT-11+CDDP療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 0mg		1回							

RP	オーダーコメント
01	キープ