

第三内科

レジメン名称 : 後)Paclitaxel単独療法(Weekly投与)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	80mg/m2		85mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:後)Paclitaxel単独療法(Weekly投与) 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホフラン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)Paclitaxel単独療法(Weekly投与) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	16.5mg 1A 1A 1A 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:後)Paclitaxel単独療法(Weekly投与) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
	<次ページあり>										

第三内科

レジメン名称 : 後)Paclitaxel単独療法(Weekly投与)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	リテム3A 輸液500mL 療法名:後)Paclitaxel単独療法(Weekly投与) 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デキストロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL ラモセトリン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)Paclitaxel単独療法(Weekly投与) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	16.5mg 1A 1A 1A 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:後)Paclitaxel単独療法(Weekly投与) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	キープ