

第三内科

レジメン名称 : ドセタキセル単独療法

レジメン説明 : 2015移行により生成
2017/8/23 アルコールフリードセタキセルに変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ドセタキセル点滴静注「EE」※	60mg/m2		70mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:ドセタキセル単独療法 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	ラモセトン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ドセタキセル単独療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 6.6mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ドセタキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:ドセタキセル単独療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						