

第三内科

レジメン名称 : 後) 【初回】 Cap/CDDP/T-mab 【プロイメント注】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
		投与経路:末梢サブルート1									
06	静注(ワンショット)	テシックス注20mg 2mL 生理食塩液 20mL フラソプル 療法名:後) 【初回】 Cap/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 静脈内注射 (ワンショット) :	20mg 20mL			1回					
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後) 【初回】 Cap/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL			1回					
08	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【初回】 Cap/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL				1回	1回	1回		
09	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【初回】 Cap/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL				1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
01	キープ
05	CDDPの投与前30分に投与する。
06	CDDPの投与前
08	ルートキープ

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 後) 【2回目以降】 Cap/CDDP/T-mab⁷ロイメント⁷注

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
		投与経路:末梢サブルート1									
06	静注(ワンショット)	リツクス注20mg 2mL 生理食塩液 20mL フラソプル 療法名:後) 【2回目以降】 Cap/CDDP/T-mab ⁷ ロイメント ⁷ 静脈内注射 (ワンショット) :	20mg 20mL			1回					
07	点滴静注	(化)シス ⁷ ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:後) 【2回目以降】 Cap/CDDP/T-mab ⁷ ロイメント ⁷ 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL			1回					
08	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【2回目以降】 Cap/CDDP/T-mab ⁷ ロイメント ⁷ 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL				1回	1回	1回		
09	点滴静注	デキサト注射液(デカト ⁷ 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【2回目以降】 Cap/CDDP/T-mab ⁷ ロイメント ⁷ 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL				1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
01	キープ
05	CDDPの投与前30分に投与する。
06	CDDPの投与前
08	ルートキープ