

第三内科

レジメン名称 : SOX/T-mab療法【初回】

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 : <S-1>

★80mg/m²/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg
05	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※	100mg/m ²		105mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:SOX/T-mab療法【初回】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL		投与順 1						
02	点滴静注	生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:SOX/T-mab療法【初回】 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	50mL		投与順 2						
03	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:SOX/T-mab療法【初回】 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 3						
04	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml アロキ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:SOX/T-mab療法【初回】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 1V 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:SOX/T-mab療法【初回】 <次ページあり>	0mg 250mL		投与順 5						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : SOX/T-mab療法【初回】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
02	ハセプチン フラッシュ
03	オキサリプラチン ルートキープ
04	オキサリプラチン投与30分前

第三内科

レジメン名称 : SOX/T-mab療法【2回目以降】

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 : <S-1>

★80mg/m²/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※	6mg/kg		6.3mg/kg
05	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※	100mg/m ²		105mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:SOX/T-mab療法【2回目以降】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL		投与順 1						
02	点滴静注	生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:SOX/T-mab療法【2回目以降】 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	50mL		投与順 2						
03	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:SOX/T-mab療法【2回目以降】 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 3						
04	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml アロキン静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:SOX/T-mab療法【2回目以降】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 1V 100mL		投与順 4						
05	点滴静注 <次ページあり>	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:SOX/T-mab療法【2回目以降】	0mg 250mL		投与順 5						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : SOX/T-mab療法【2回目以降】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	問題なければ2回目以降30分まで短縮可
02	ハセプチン フラッシュ
03	オキサリプラチン ルートキープ
04	オキサリプラチン投与30分前