

第三内科

レジメン名称 : 【初回】 TS-1/CDDP/T-mab 【プロイメント注】

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/7/20 フロイミド「テハ」 → 「武田テハ」 の変更に伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ハセプチン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	60mg/m2		63mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:【初回】 TS-1/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴速度 80m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		4回	2回	4回				
02	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 大塚食塩注10% 20mL 療法名:【初回】 TS-1/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 20mL			2回					
03	点滴静注	(化)ハセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:【初回】 TS-1/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL			1回					
04	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:【初回】 TS-1/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL			1回					
05	点滴静注	アロキソ静注0.75mg 5mL テキアト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:【初回】 TS-1/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 点滴静注:	0.75mg 9.9mg 100mL			1回					
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 【初回】 TS-1/CDDP/T-mab 【プロイメント注】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	静注(ワンショット)	プロイメント (ラシックス後発) 注20mg「武田テバ」 2mL 生理食塩液 20mL プラソプル 療法名: 【初回】 TS-1/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 静脈内注射 (ワンショット) :	20mg 20mL			1回					
07	点滴静注	(化)シプロラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバグ「テルモ」 療法名: 【初回】 TS-1/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL			1回					
08	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【初回】 TS-1/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL				1回	1回	1回		
09	点滴静注	テキサト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【初回】 TS-1/CDDP/T-mab 【プロイメント注】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL				1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
01	キープ
05	CDDPの投与前30分に投与する。
06	CDDPの投与前
08	ルートキープ

第三内科

レジメン名称 : 【2回目以降】 TS-1/CDDP/T-mab[®]ロイメ[®]ト

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/7/20 フロゼ[®]ト「テハ」 → 「武田テハ」の変更に伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ハセ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※	6mg/kg		6.3mg/kg
07	点滴静注	(化)シス [®] チン点滴静注「マルコ」※	60mg/m ²		63mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
01	点滴静注	ソルテ [®] ム3A 輸液500mL 療法名: 【2回目以降】 TS-1/CDDP/T-mab [®] ロイメ [®] ト 点滴静注: *点滴速度 80m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		4回	2回	4回				
02	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ソフトバ [®] ック [®] 大塚食塩注10% 20mL 療法名: 【2回目以降】 TS-1/CDDP/T-mab [®] ロイメ [®] ト 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 20mL			2回					
03	点滴静注	(化)ハセ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL フラボ [®] トル 療法名: 【2回目以降】 TS-1/CDDP/T-mab [®] ロイメ [®] ト 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL			1回					
04	点滴静注	ロイメ [®] ト点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【2回目以降】 TS-1/CDDP/T-mab [®] ロイメ [®] ト 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL			1回					
05	点滴静注	テ [®] キート注射液(テ [®] カ [®] ト [®] 後発)※ ア [®] キシ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【2回目以降】 TS-1/CDDP/T-mab [®] ロイメ [®] ト 点滴静注:	9.9mg 0.75mg 100mL			1回					
<次ページあり>											

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 【2回目以降】TS-1/CDDP/T-mab[®]ロイメト[®]

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	静注(ワンショット)	フロピト [®] (ラシックス後発)注20mg「武田テバ [®] 」2mL 生理食塩液 20mL プラアンプル 療法名:【2回目以降】TS-1/CDDP/T-mab [®] ロイメト [®] 静脈内注射(ワンショット):	20mg 20mL			1回					
07	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバ [®] ック「テルモ」 療法名:【2回目以降】TS-1/CDDP/T-mab [®] ロイメト [®] 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL			1回					
08	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:【2回目以降】TS-1/CDDP/T-mab [®] ロイメト [®] 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL				1回	1回	1回		
09	点滴静注	テ [®] キヤート注射液(テ [®] カト [®] ロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:【2回目以降】TS-1/CDDP/T-mab [®] ロイメト [®] 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL				1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
01	キープ
05	CDDPの投与前30分に投与する。
06	CDDPの投与前
08	ルートキープ