

第三内科

レジメン名称 : CPT-11+T-mab 【CPT-11】

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)トポ テン点滴静注※	150mg/m2		160mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:CPT-11+T-mab 【CPT-11】 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	アロキン静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CPT-11+T-mab 【CPT-11】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 6.6mg 100mL		投与順 2								
03	点滴静注	(化)トポ テン点滴静注※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:CPT-11+T-mab 【CPT-11】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3								

RP	オーダーコメント
01	キープ

インターバル日数 : 1 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : CPT-11+T-mab 【初回】 Triweekly T-mab

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: $\text{体重(kg)}^{0.425} \times \text{身長(cm)}^{0.725} \times 0.007184$ 女性用: $\text{体重(kg)}^{0.425} \times \text{身長(cm)}^{0.725} \times 0.007184$

AUC計算式 : 男性用: $\text{AUC} \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$ 女性用: $\text{AUC} \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:CPT-11+T-mab 【初回】 Triweekly T-mab 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL		投与順 3						

インターバル日数 : 1 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : CPT-11+T-mab 【2回目以降】 Triweekly T-mab

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	6mg/kg		6.3mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:CPT-11+T-mab 【2回目以降】 Triweekly T-mab 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL		投与順 3						