

インターバル日数 : 1 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : T-mab+パクリ 【初回】 Triweekly T-mab

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:T-mab+パクリ 【初回】 Triweekly T-mab 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL		投与順 3						

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : T-mab+パクリ 【Paclitaxel】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:T-mab+パクリ 【Paclitaxel】 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	ラモセトン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:T-mab+パクリ 【Paclitaxel】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 6.6mg 5mg 20mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名:T-mab+パクリ 【Paclitaxel】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	キープ

第三内科

レジメン名称 : T-mab+パクリ 【2回目以降】 Triweekly T-mab

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	6mg/kg		6.3mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:T-mab+パクリ 【2回目以降】 Triweekly T-mab 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL		投与順 3						