

第三内科

レジメン名称 : TACE (アイエーコール) 療法

レジメン説明 : 2015移行により生成  
 2017/4/5 DEB-TACEのコメントが間違っ入っていたため削除  
 2017/6/20 医師より依頼有りアタックスP削除  
 2018/7/24 アイエーコール50mgのマス削除に伴い、アイエーコール※→アイエーコール100mgに修正  
 2020/4/7 医療安全より投与順序の変更依頼あり、修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	動脈注射(その他)	(化)動注用アイエーコール100mg	65mg/m2		100mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3					
01	筋肉注射	ソセコン注射液15mg 1mL 療法名:TACE (アイエーコール) 療法 筋肉注射:	15mg		投与順 1							
02	点滴静注	ラクテック注 500mL ソフトバッグ アトナ注 (静脈用) ※ トランサミン注※ 療法名:TACE (アイエーコール) 療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 25mg 250mg		投与順 2							
03	点滴静注	テキサート注射液(テカトロン後発)※ グラネセトロン静注液3mg「NK」 3mL 生理食塩液 50mL プラホトル 療法名:TACE (アイエーコール) 療法 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 3mg 50mL		投与順 3							
04	動脈注射(その他)	(化)動注用アイエーコール100mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:TACE (アイエーコール) 療法 動脈注射(その他):持続 *点滴時間 30分で	0mg 70mL		投与順 4							
05	点滴静注  <次ページあり>	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:TACE (アイエーコール) 療法 点滴静注: *点滴時間 4時間で	500mL		3回	2回	2回					

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : TACE (アイエーコル) 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		投与経路:末梢ルートメイン1									
06	点滴静注	ワイスカール配合点滴静注用1gバッグ 療法名:TACE (アイエーコル) 療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	1キット		2回	2回	2回				
07	ロック	ロック用 生食注シリンジ 10mL「オツカ」 療法名:TACE (アイエーコル) 療法 ロック:	10mL			1回	1回				

RP	オーダーコメント
02	搬入前
03	搬入時持参
04	*薬剤部で調製しアキオ室に払い出し