

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : TACE (エビ°ルビ°シシ 50mg) 療法

レジメン説明 : 2019/12/4 3内医師よりMMC供給停止に伴い、Epiを40mg→50mgに変更依頼有り作成。
2020/4/7 医療安全より投与順所の変更依頼有り変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	カテ注入:塞栓・溶解	(化)エビ°ルビ°シシ塩酸塩注射用「NK」※	50mg		50mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	筋肉注射	ソレコソ注射液15mg 1mL 療法名:TACE (エビ°ルビ°シシ 50mg) 療法 筋肉注射:	15mg		投与順 1						
02	点滴静注	ラクテック注 500mL ソフトバック° アドナ注 (静脈用) ※ トランミン注※ 療法名:TACE (エビ°ルビ°シシ 50mg) 療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 25mg 250mg		投与順 2						
03	点滴静注	デキサト注射液(デカト°後発)※ グラセト°静注液3mg「NK」 3mL 生理食塩液 50mL フラボ°トル 療法名:TACE (エビ°ルビ°シシ 50mg) 療法 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 3mg 50mL		投与順 3						
04	カテ注入:塞栓・溶解	(化)エビ°ルビ°シシ塩酸塩注射用「NK」※ 生理食塩液 20mL フラソ°トル 療法名:TACE (エビ°ルビ°シシ 50mg) 療法 カテテル下注入(塞栓・溶解術):	0mg 20mL		投与順 4						
05	点滴静注	ソルテ°ム3A 輸液500mL 療法名:TACE (エビ°ルビ°シシ 50mg) 療法 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		2回						
06	点滴静注	ワイス°タル配合点滴静注用1g°バック° 療法名:TACE (エビ°ルビ°シシ 50mg) 療法 点滴静注:	1キット		2回	2回	2回				

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : TACE (エビ°ルビ°シ 50mg) 療法

	<次ページあり>										
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : TACE (エビ°ルビ°シ 50mg) 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		*点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1									
07	ロック	ロック用 生食注シシ° 10mL「オツカ」 療法名:TACE (エビ°ルビ°シ 50mg) 療法 ロック:	10mL			2回	1回				

RP	オーダーコメント
02	搬入前
03	搬入時持参
04	搬入時持参