

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : ATZ + BEV療法

レジメン説明 : 2020/10/19 承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg	1200mg		1200mg
03	点滴静注	(化)アパズチン点滴静注用※	15mg/kg		15.75mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:ATZ + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 150分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:ATZ + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)アパズチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ATZ + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2又は0.22μmのフィルターを使用すること 忍容性が良ければ2回目以降は30分まで短縮可
03	初回90分。忍容性が良ければ2回目60分、3回目以降は30分まで短縮可