

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 肝癌動注療法ミリプラ

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	動脈注射(その他)	(化)ミリプラ動注用 70mg	70mg		120mg
05	動脈注射(その他)	(化)ミリプラ用懸濁用液 4mL	3.5mL		6mL

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	筋肉注射	ソセコン注射液15mg 1mL アタラックス-P注射液(25mg/mL) 1mL 療法名:肝癌動注療法ミリプラ 筋肉注射:	15mg 25mg		1回						
02	点滴静注	ラクテック注 500mL ソトバッグ アトナ注(静脈用) ※ トランサミン注※ 療法名:肝癌動注療法ミリプラ 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 25mg 250mg		1回						
03	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:肝癌動注療法ミリプラ 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		2回						
04	点滴静注	デキサート注射液(デカドロン後発) ※ グラセトン静注液3mg「NK」 3mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:肝癌動注療法ミリプラ 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 3mg 50mL		1回						
05	動脈注射(その他)	(化)ミリプラ動注用 70mg (化)ミリプラ用懸濁用液 4mL 療法名:肝癌動注療法ミリプラ 動脈注射(その他):ワンショット	0mg 0mL		1回						
06	点滴静注	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ	1キット		2回	2回	2回				

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 肝癌動注療法ミリプラ

	<次ページあり>	療法名:肝癌動注療法ミリプラ									
--	----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 肝癌動注療法ミリプラ

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1									
07	ロック	ロック用 生食注シリンジ 10mL「オツカ」 療法名:肝癌動注療法ミリプラ ロック:	10mL			2回	1回				