

第三内科

レジメン名称 : 後)Weekly Paclitaxel 食道癌 6投2休

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	100mg/m2		105mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:後)Weekly Paclitaxel 食道癌 6投2休 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	点滴静注	グラネヒロン点滴静注バグ 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホフラン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL 療法名:後)Weekly Paclitaxel 食道癌 6投2休 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 5mg 20mg		投与順 2							
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:後)Weekly Paclitaxel 食道癌 6投2休 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3							

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ