

第三内科

レジメン名称 : 後)FP-RT分割

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	中心静脈注射	(化)5-FU注※	400mg/m2		410mg/m2
04	中心静脈注射	(化)シス ^{ラチン} 点滴静注「マルコ」※	40mg/m2		45mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	中心静脈注射	アミノリパ ¹ 号 1700mL 材ラミン・マルチV注射用 (化)5-FU注※ 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:CVルートメイン1	1700mL 1V 0mg		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
02	中心静脈注射	フジオ 35輸液 500mL 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL		10:00						
03	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH ラセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1	100mL 1A		12:00						
04	中心静脈注射	(化)シス ^{ラチン} 点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバ ^{ック} 「テルモ」 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVルートメイン1	0mg 500mL		12:30						
05	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH デキサト注射液(デ ^{カト} ロン後発)※ プリンパ ^{ラン} 注射液 10mg 2ml 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: <次ページあり>	100mL 13.2mg 3A		14:30						

第三内科

レジメン名称 : 後)FP-RT分割

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	中心静脈注射	アミノトリパ ¹ 号 1700mL ネオラミン・マルチV注射用 (化)5-FU注※ 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:CVルートメイン1	1700mL 1V 0mg		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
02	中心静脈注射	フィジオ 35輸液 500mL 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL		10:00						
03	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1	100mL 1A		12:00						
04	中心静脈注射	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVルートメイン1	0mg 500mL		12:30						
05	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH デキサメタゾン注射液(デキサメタゾン後発)※ プリンパラン注射液 10mg 2ml 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1	100mL 13.2mg 3A		14:30						
06	中心静脈注射	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL		15:00						
07	中心静脈注射 <次ページあり>	生食溶解液 100mL キットH デキサメタゾン注射液(デキサメタゾン後発)※	100mL 3.3mg			10:00	10:00	10:00	10:00		

インターバル日数 : 35 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 後)FP-RT分割

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
		アリパラン注射液 10mg 2ml 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1	3A								
08	中心静脈注射	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 2.5時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL			10:30	10:30	10:30	10:30		
09	中心静脈注射	大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 2.5時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL			13:00	13:00	13:00	13:00		
10	中心静脈注射	アミノリパ1号 1700mL ネオアミン・マルチV注射用 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:CVルートメイン1	1700mL 1V							10:00	10:00
11	中心静脈注射	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)FP-RT分割 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL							10:00	10:00