

第三内科

レジメン名称 : Avastin 【10mg/kg】 +FOLFIRI療法 3内科

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018.7.2 ポンプ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	中心静脈注射	(化)アバスタチン点滴静注用※	10mg/kg		11mg/kg
04	中心静脈注射	(化)トポテシン点滴静注用※	150mg/m2		155mg/m2
05	中心静脈注射	(化)レボレチナート点滴静注用※「ヤクルト」	200mg/m2		210mg/m2
06	中心静脈注射	(化)5-FU注※	400mg/m2		410mg/m2
07	中心静脈注射	(化)5-FU注※	2400mg/m2		2450mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Avastin 【10mg/kg】 +FOLFIRI療法 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	デキスト注射液(デキストン後発)※ ホウリン注 5mg 1ml ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Avastin 【10mg/kg】 +FOLFIRI療法 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVサブルート1 全開で滴下	6.6mg 5mg 0.3mg 50mL		投与順 2						
03	中心静脈注射	(化)アバスタチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Avastin 【10mg/kg】 +FOLFIRI療法 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 90分で 投与経路:CVサブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
04	中心静脈注射	(化)トポテシン点滴静注用※ 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名:Avastin 【10mg/kg】 +FOLFIRI療法 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で <次ページあり>	0mg 250mL		投与順 4						

第三内科

レジメン名称 : Avastin 【10mg/kg】 + FOLFIRI療法 3内科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3			
		投与経路: CVサブルート1								
05	中心静脈注射	(化)レボホリナート点滴静注用※「ヤルト」 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名: Avastin 【10mg/kg】 + FOLFIRI療法 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路: CVサブルート2	0mg 250mL		投与順 5					
06	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: Avastin 【10mg/kg】 + FOLFIRI療法 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路: CVサブルート1	0mg 50mL		投与順 6					
07	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: Avastin 【10mg/kg】 + FOLFIRI療法 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 46時間で 投与経路: CVルートメイン1	0mg 140mL		投与順 7					
08	ロック	ロック用 生食注シリンジ 10mL 「オツカ」 療法名: Avastin 【10mg/kg】 + FOLFIRI療法 3内科 ロック:	1本		1回		1回			

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アバスチン投与30分前に
03	初回90分。忍容性良ければ2回目60分。 3回目以降、30分まで短縮可。
04	レボホリナートと同時投与
05	トポテシンと同時投与
07	全量140mL インフューザーポンプ使用