

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 12クール

第三内科

レジメン名称 : FOLFOXIRI + Bev

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
05	中心静脈注射	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + Bev 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 5						
06	中心静脈注射	(化)レボホリナート点滴静注用※「ヤルト」 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + Bev 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVサブルート2	0mg 250mL		投与順 6						
07	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + Bev 中心静脈注射: *点滴時間 48時間で 投与経路:CVポート	0mg 140mL		投与順 7						
08	ロック	ロック用 生食注射液 10mL 「オツカ」 療法名:FOLFOXIRI + Bev ロック:	10mL		1回		1回				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	初回90分、忍容性良ければ2回目60分、3回目以降30分まで短縮可
05	レボホリナートと同時投与
06	オキサリプラチンと同時投与
07	全量140mL インフューザーポンプ使用