

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : アパ`スチン+XELOX療法 (カ`シタビ`ン内服) 3内

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 : <カ`シタビ`ン>

★2000mg/m2/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技   | 薬剤名称                             | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値      |
|----|------|----------------------------------|----------|-----|----------|
| 03 | 点滴静注 | (化)アパ`スチン点滴静注用※                  | 7.5mg/kg |     | 7.9mg/kg |
| 04 | 点滴静注 | (化)オキサリプラチン(エルブ`ラット後発)点滴静注液「NK」※ | 130mg/m2 |     | 137mg/m2 |

| RP | 手技   | 薬剤名称   | 用量/単位               | 処方1回量 | Day1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------|--|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH<br>療法名:アパ`スチン+XELOX療法 (カ`シタビ`ン内服) 3内<br>点滴静注:<br>*点滴速度 100m l /hr<br>投与経路:末梢ルートメイン1   | 100mL               |       | 投与順 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 点滴静注 | デ`キサート注射液(デ`カト`ン後発)※<br>ホ`ラミン注 5mg 1ml<br>グ`ラネトロン点滴静注バ`ッ` 3mg/100mL「NK」<br>療法名:アパ`スチン+XELOX療法 (カ`シタビ`ン内服) 3内<br>点滴静注:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢サブルート1 | 6.6mg<br>5mg<br>3mg |       | 投与順 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 点滴静注 | (化)アパ`スチン点滴静注用※<br>生食溶解液 100mL キットH<br>療法名:アパ`スチン+XELOX療法 (カ`シタビ`ン内服) 3内<br>点滴静注:<br>*点滴時間 90分で<br>投与経路:末梢サブルート1                                     | 0mg<br>100mL        |       | 投与順 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 点滴静注 | (化)オキサリプラチン(エルブ`ラット後発)点滴静注液「NK」※<br>大塚糖液 5% 250mL プ`ラボ`トル<br>療法名:アパ`スチン+XELOX療法 (カ`シタビ`ン内服) 3内<br>点滴静注:<br>*点滴時間 120分で<br>投与経路:末梢サブルート1              | 0mg<br>250mL        |       | 投与順 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RP | オーダーコメント     |
|----|--------------|
| 01 | ルートキープ       |
| 02 | アパ`スチン投与30分前 |

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : アバスチン+XELOX療法 (カペシタシン内服) 3内

| RP | オーダーコメント             |
|----|----------------------|
| 03 | 初回のみ90分、次回から60~90分で。 |