

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : (導入1週目)ア-ビ`タックス+トポ`テシ` 3内科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
06	フラッシュ	ロック用 生食注シリンジ` 10mL 「ホ`ツカ」 療法名 : (導入1週目)ア-ビ`タックス+トポ`テシ` 3内科 フラッシュ:	10mL		1回						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	ア-ビ`タックス投与30分前に投与
03	全量500mL 投与速度10mg/分以下
05	投与前フラッシュ用
06	投与後フラッシュ用

第三内科

レジメン名称 : (導入2週目以降)アビタックス+トポテン 3内科

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アビタックス投与30分前に投与
03	全量250mL 投与速度10mg/分以下
04	投与前フラッシュ用
05	投与後フラッシュ用
06	アビタックス投与30分前に投与

インターバル日数 : 49 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : (8週目以降)ア-ビ`タックス+トボ`テシ 3内科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day43						
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名 : (8週目以降)ア-ビ`タックス+トボ`テシ 3内科 中心静脈注射: *点滴速度 100ml /hr 投与経路: CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	ボ`ラミン注 5mg 1ml デ`キサト注射液(デ`カト`ロン後発)※ ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL プ`ラボ`トル 療法名 : (8週目以降)ア-ビ`タックス+トボ`テシ 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路: CVサブルート1	5mg 6.6mg 0.3mg 50mL								
03	中心静脈注射	(化)ア-ビ`タックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 250mL プ`ラボ`トル 療法名 : (8週目以降)ア-ビ`タックス+トボ`テシ 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 1時間で 投与経路: CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	中心静脈注射	(化)トボ`テシ点滴静注※ 大塚糖液 5% 250mL プ`ラボ`トル 療法名 : (8週目以降)ア-ビ`タックス+トボ`テシ 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 90分で 投与経路: CVサブルート1	0mg 250mL								
05	フラッシュ	ロック用 生食注シリンジ` 10mL 「ホ`ツカ」 療法名 : (8週目以降)ア-ビ`タックス+トボ`テシ 3内科 フラッシュ:	10mL		1回						
06	フラッシュ	ロック用 生食注シリンジ` 10mL 「ホ`ツカ」 療法名 : (8週目以降)ア-ビ`タックス+トボ`テシ 3内科 フラッシュ:	10mL		1回						
07	中心静脈注射	ボ`ラミン注 5mg 1ml デ`キサト注射液(デ`カト`ロン後発)※ 生理食塩液 50mL プ`ラボ`トル 療法名 : (8週目以降)ア-ビ`タックス+トボ`テシ 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路: CVサブルート1	5mg 6.6mg 50mL		投与順 2						

第三内科

レジメン名称 : (8週目以降)アビタックス+トポテン 3内科

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アビタックス投与30分前に投与
03	全量250mL 投与速度10mg/分以下
05	投与前フラッシュ用
06	投与後フラッシュ用
07	アビタックス投与30分前に投与