

第三内科

レジメン名称 : アービ`タックス+mFOLFOX6 (導入) ※原則入院

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2018.7.2 ポンプ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL	400mg/m2		420mg/m2
04	中心静脈注射	(化)キザリア`ラチン(エルブ`ラット後発)点滴静注液「NK」※	85mg/m2		88mg/m2
05	中心静脈注射	(化)レボ`ホリナト点滴静注用※「ヤクルト」	200mg/m2		210mg/m2
06	中心静脈注射	(化)5-FU注※	400mg/m2		420mg/m2
07	中心静脈注射	(化)5-FU注※	2400mg/m2		2520mg/m2
10	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL	250mg/m2		262.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:アービ`タックス+mFOLFOX6 (導入) ※原則入院 中心静脈注射: *点滴速度 100m l/hr 投与経路: CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	ホ`ラミン注 5mg 1ml テ`キヤート注射液(テ`カト`ロン後発)※ ア`ロキソ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:アービ`タックス+mFOLFOX6 (導入) ※原則入院 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路: CVサブルート1	5mg 6.6mg 1V 100mL		投与順 2						
03	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 500mL ソフトバ`ック`「テルモ」 療法名:アービ`タックス+mFOLFOX6 (導入) ※原則入院 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路: CVサブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	中心静脈注射	(化)キザリア`ラチン(エルブ`ラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL プ`ラボ`トル 療法名:アービ`タックス+mFOLFOX6 (導入) ※原則入院 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で	0mg 250mL		投与順 4						
	<次ページあり>										





インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : アービ`タックス+mFOLFOX6 (導入) ※原則入院

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		生理食塩液 50mL フラボ`トル 療法名:アービ`タックス+mFOLFOX6 (導入) ※原則入院 中心静脈注射: *点滴時間 46時間で 投与経路:CVルートメイン1	140mL								
08	フラッシュ	ロック用生食注射液 10mL 「ホ`ツカ」 療法名:アービ`タックス+mFOLFOX6 (導入) ※原則入院 フラッシュ:	10mL		2回						
09	中心静脈注射	ボ`ラミン注 5mg 1ml デ`キサト注射液 (デ`カト`ロン後発) ※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:アービ`タックス+mFOLFOX6 (導入) ※原則入院 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	5mg 6.6mg 100mL		投与順 2						
10	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 250mL フラボ`トル 療法名:アービ`タックス+mFOLFOX6 (導入) ※原則入院 中心静脈注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	投与速度10mg/分以下 全量500mlに調製
04	レボホリナートと同時投与
05	オキサリプラチンと同時投与
07	全量140mL インフューザーポンプ使用
10	投与速度10mg/分以下 全量250mlに調製







## 第三内科

レジメン名称 : アービ`タックス+mFOLFOX6 (維持)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		生理食塩液 50mL プラボ`トル 療法名:アービ`タックス+mFOLFOX6 (維持) 中心静脈注射: *点滴時間 46時間で 投与経路: CVルートメイン1	140mL								
08	フラッシュ	ロック用 生食注シリンジ` 10mL 「ホ`ツカ」 療法名:アービ`タックス+mFOLFOX6 (維持) フラッシュ:	10mL		2回						
09	中心静脈注射	ボ`ラミン注 5mg 1ml デ`キサト注射液 (デ`カト`ロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:アービ`タックス+mFOLFOX6 (維持) 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路: CVサブルート1	5mg 6.6mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	投与速度10mg/分以下 全量250mlに調製
04	レボホリナートと同時投与
05	オキサリプラチンと同時投与
07	全量140mL インフューザーポンプ使用