

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 【q2w】ア-ビ`タックス+トポ`テシ 3内科

レジメン説明 : 2020/9/30承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	中心静脈注射	(化)ア-ビ`タックス注射液100mg 20mL	500mg/m2		525mg/m2
04	中心静脈注射	(化)トポ`テシ点滴静注※	150mg/m2		157.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【q2w】ア-ビ`タックス+トポ`テシ 3内科 中心静脈注射: *点滴速度 100m l /hr 投与経路: CVルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	中心静脈注射	ポ`ラミン注 5mg 1ml デ`キナート注射液(デ`カド`ロン後発)※ ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL フ`ラホ`トル 療法名: 【q2w】ア-ビ`タックス+トポ`テシ 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路: CVサブルート1	5mg 6.6mg 0.3mg 50mL		投与順 2								
03	中心静脈注射	(化)ア-ビ`タックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 500mL ソフトバ`ッグ「テルモ」 療法名: 【q2w】ア-ビ`タックス+トポ`テシ 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路: CVサブルート1	0mg 500mL		投与順 3								
04	中心静脈注射	(化)トポ`テシ点滴静注※ 大塚糖液 5% 250mL ソフトバ`ッグ 療法名: 【q2w】ア-ビ`タックス+トポ`テシ 3内科 中心静脈注射: *点滴時間 90分で 投与経路: CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 4								
05	フラッシュ	ロック用 生食注射液 10mL 「オーツカ」 療法名: 【q2w】ア-ビ`タックス+トポ`テシ 3内科 フラッシュ:	10mL		1回								
06	フラッシュ <次ページあり>	ロック用 生食注射液 10mL 「オーツカ」	10mL		1回								

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 【q2w】アビタックス+トポテン 3内科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		療法名: 【q2w】アビタックス+トポテン 3内科 フラッシュ:									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	全量500mL 投与速度10mg/分以下