

第三内科

レジメン名称 : ベ`クテイ`ックス+FOLFIRI

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
05	中心静脈注射	(化)レボ`ホリナート点滴静注用※「ヤクルト」 大塚糖液 5% 250mL プラボ`トル 療法名:ベ`クテイ`ックス+FOLFIRI 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVサブルート2	0mg 250mL		投与順 5						
06	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 大塚糖液 5% 50mL プラボ`トル 療法名:ベ`クテイ`ックス+FOLFIRI 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVサブルート1	0mg 50mL		投与順 6						
07	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボ`トル 療法名:ベ`クテイ`ックス+FOLFIRI 中心静脈注射: *点滴時間 46時間で 投与経路:CVルートメイン1	0mg 140mL		投与順 7						
08	フラッシュ	ロック用 生食注シリンジ` 10mL 「オーツカ」 療法名:ベ`クテイ`ックス+FOLFIRI フラッシュ:	10mL		1回		1回				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	全量100mL 0.2or0.22 μmのインラインフィルターを通す ※1回1000mgを超える場合は添書参照
04	レボ`ホリナートと同時投与
05	トポテシンと同時投与
07	全量140mL インフューザーポンプ使用