

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : アブラキサン+ゲムシタビン

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:アブラキサン+ゲムシタビン 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(ゲムシタロン後発)※ アロキン静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:アブラキサン+ゲムシタビン 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:アブラキサン+ゲムシタビン 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:アブラキサン+ゲムシタビン 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	フィルターを通さないこと