



インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科 【MSI-High】

レジメン名称 : Nivo+Ipi 療法 【大腸MSI-H】 (1~4回目)

RP	オーダーコメント
01	ルートキーブ
03	0.2又は0.22 $\mu$ mのフィルター使用
04	ポンジホ終了後30分かけて投与 (ポンジホ開始までの30分の観察期間用)
05	0.2~1.2 $\mu$ mのフィルター使用 最終濃度 : 1~4mg/mL

第三内科 【MSI-High】

レジメン名称 : Nivo+Ipi 療法【大腸MSI-H】 (5回目以降)

レジメン説明 : 2020/11/10承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)オゾゾ点滴静注※	240mg		240mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キット 療法名:Nivo+Ipi 療法【大腸MSI-H】 (5回目以降) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	ポラシ注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Nivo+Ipi 療法【大腸MSI-H】 (5回目以降) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2								
03	点滴静注	(化)オゾゾ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キット 療法名:Nivo+Ipi 療法【大腸MSI-H】 (5回目以降) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22μmのフィルター使用

レジメン名称：【q4w】Nivo+Ipi療法【大腸MSI-H】5回以降

【MSI-High】

第三内科

レジメン説明： 2020/11/10承認

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式： 男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)オゾゾ点滴静注※	480mg		480mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名：【q4w】Nivo+Ipi療法【大腸MSI-H】5回以降 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	ポラリシ注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL フラットル 療法名：【q4w】Nivo+Ipi療法【大腸MSI-H】5回以降 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2								
03	点滴静注	(化)オゾゾ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名：【q4w】Nivo+Ipi療法【大腸MSI-H】5回以降 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22μmのフィルター使用