

第三内科

レジメン名称 : 胃癌 mFOLFOX6 + Tmab 【2回目以降】 3内

レジメン説明 : 2021/9/9承認

適用条件 :

除外条件 :

体表積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

IP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
13	中心静脈注射	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	6mg/kg		6.3mg/kg
14	中心静脈注射	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※	85mg/m2		89.25mg/m2
15	中心静脈注射	(化)レボレチナート点滴静注用※「キルト」	200mg/m2		210mg/m2
16	中心静脈注射	(化)5-FU注※	400mg/m2		420mg/m2
17	中心静脈注射	(化)5-FU注※	2400mg/m2		2520mg/m2

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
11	中心静脈注射	生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:胃癌 mFOLFOX6 + Tmab 【2回目以降】 3内 中心静脈注射: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:CVルートメイン1	250mL		投与順 1						
12	中心静脈注射	パロセトン(アロキ後発)静注0.75mg/5mL「クイッド」 デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胃癌 mFOLFOX6 + Tmab 【2回目以降】 3内 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 2						
13	中心静脈注射	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:胃癌 mFOLFOX6 + Tmab 【2回目以降】 3内 中心静脈注射: *点滴時間 90分で 投与経路:CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
14	中心静脈注射	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL ソフトバック 療法名:胃癌 mFOLFOX6 + Tmab 【2回目以降】 3内 中心静脈注射: *点滴時間 120分で 投与経路:CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 4						
15	中心静脈注射 <次ページあり>	(化)レボレチナート点滴静注用※「キルト」 大塚糖液 5% 250mL ソフトバック	0mg 250mL		投与順 5						

第三内科

レジメン名称 : 胃癌 mFOLFOX6 + Tmab 【2回目以降】 3内

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		療法名:胃癌 mFOLFOX6 + Tmab 【2回目以降】 3内 中心静脈注射: *点滴時間 120分で 投与経路:CVサブルート2									
06	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:胃癌 mFOLFOX6 + Tmab 【2回目以降】 3内 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVサブルート1	0mg 50mL		投与順 6						
07	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:胃癌 mFOLFOX6 + Tmab 【2回目以降】 3内 中心静脈注射: *点滴時間 46時間で 投与経路:CVルートメイン1	0mg 150mL		投与順 7						
08	ロック	ロック用 生食注リンゾ 10mL 「オツカ」 療法名:胃癌 mFOLFOX6 + Tmab 【2回目以降】 3内 ロック:	1本		1回		1回				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	忍容性が良ければ、2回目以降30分まで短縮可
04	レボホリナートと同時投与
05	オキサリプラチンと同時投与
07	全量150mL インフューザーポンプ使用