

第三内科

レジメン名称 : 胃癌 Nivolumab + CapeOX 3内

レジメン説明 : 2021/12/24承認

適用条件 : <カペシタビン>

★2000mg/m2/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

除外条件 :

体表積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

JP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
13	点滴静注	(化)オプジーボ [®] 点滴静注※	360mg		360mg
14	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※	130mg/m2		136.5mg/m2

JP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
11	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボ [®] ル 療法名:胃癌 Nivolumab + CapeOX 3内 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
12	点滴静注	パロリトロン(アキシ後発)静注0.75mg/5mL「タイカ」 デキスト注射液(デカトロン後発)※ ボラシン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胃癌 Nivolumab + CapeOX 3内 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 6.6mg 5mg 100mL		投与順 2						
13	点滴静注	(化)オプジーボ [®] 点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胃癌 Nivolumab + CapeOX 3内 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
14	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL リトバ [®] ック 療法名:胃癌 Nivolumab + CapeOX 3内 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

JP	オーダーコメント
11	ルートキープ

第三内科

レジメン名称 : 胃癌 Nivolumab + CapeOX 3内

IP	オーダーコメント
13	0.2又は0.22 μ mのフィルター使用