

第三内科

レジメン名称 : biweekly DCF療法

レジメン説明 : 2021/1/8承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|------|----------------------|----------|-----|-----------|
| 05 | 点滴静注 | (化)ドセキセル点滴静注「EE」※ | 30mg/m2 | | 31.5mg/m2 |
| 07 | 点滴静注 | (化)シプロフラチン点滴静注「マルコ」※ | 80mg/m2 | | 84mg/m2 |
| 11 | 点滴静注 | (化)5-FU注※ | 800mg/m2 | | 840mg/m2 |
| 14 | 点滴静注 | (化)5-FU注※ | 800mg/m2 | | 840mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
|----|------|---|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 01 | 点滴静注 | 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 250mL | | 投与順 1 | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | グアインド輸液 500mL バック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL | | 投与順 2 | | | | | | |
| 03 | 点滴静注 | プロイソド点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 150mg 100mL | | 投与順 3 | | | | | | |
| 04 | 点滴静注 | パロセトロン(アロキソ後発)静注0.75mg/5mL 「タイ秒」 デキサト注射液(デカト後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0.75mg 9.9mg 100mL | | 投与順 4 | | | | | | |
| 05 | 点滴静注 | (化)ドセキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: <次ページあり> | 0mg 250mL | | 投与順 5 | | | | | | |

等三内科

レジメン名称 : biweekly DCF療法

| IP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
|----|------------------|---|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1 | | | | | | | | | |
| 16 | 点滴静注 | ソルテ [®] M1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL 10mL 8mL | | 投与順 6 | | | | | | |
| 17 | 点滴静注 | (化)ソフ [®] チン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 300mL | | 投与順 7 | | | | | | |
| 38 | 静注(ワンショット) | フロセミド [®] (ラシックス後発)注20mg「武田テバ [®] 」 2mL 療法名:biweekly DCF療法 静脈内注射 (ワンショット): 投与経路確保 末梢サブルート1 | 1A | | 投与順 8 | | | | | | |
| 09 | 点滴静注 | グアインド輸液 500mL バック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1 | 500mL | | 投与順 9 | | | | | | |
| 10 | 点滴静注 | ソルテ [®] M1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL 10mL | | 投与順10 | | | | | | |
| 11 | 点滴静注 | (化)5-FU注※ ソルテ [®] M3A 輸液500mL 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 500mL | | 投与順11 | | | | | | |
| 12 | 点滴静注 <次ページあり> | グアインド輸液 500mL バック | 500mL | | 投与順12 | | | | | | |

等三内科

レジメン名称 : biweekly DCF療法

| IP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
|----|------|--|--------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 点滴静注 | 生理食塩液 250mL ヲツパック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 250mL | | | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | ゲンD輸液 500mL パック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL | | | | | | | | |
| 03 | 点滴静注 | プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 150mg 100mL | | | | | | | | |
| 04 | 点滴静注 | パロセトロン(アロキシル後発)静注0.75mg/5mL「クイナ」 デキスト注射液(デキストロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0.75mg 9.9mg 100mL | | | | | | | | |
| 05 | 点滴静注 | (化)トセキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL ヲツパック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 250mL | | | | | | | | |
| 06 | 点滴静注 | ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テル」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL 10mL 8mL | | | | | | | | |
| 07 | 点滴静注 | (化)シブチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ヲツパック「テル」 | 0mg 300mL | | | | | | | | |

<次ページあり>

三内科

レジメン名称 : biweekly DCF療法

| P | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day15 | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 点滴静注 | 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 250mL | | | | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 | ゲイノD輸液 500mL パック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL | | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 | ブライント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 150mg 100mL | | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 | パロシトロン(アロキソ後発)静注0.75mg/5mL 「タイホ」 デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0.75mg 9.9mg 100mL | | | | | | | | | | |
| 5 | 点滴静注 | (化)トセキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 250mL | | 投与順 3 | | | | | | | | |
| 6 | 点滴静注 | ソルゲムI 輸液500mL KCL注20mEqキット「テル」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL 10mL 8mL | | | | | | | | | | |
| 7 | 点滴静注 | (化)シブリン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトパック「テル」 | 0mg 300mL | | | | | | | | | | |
| | <次ページあり> | | | | | | | | | | | | |

内科

レジメン名称 : biweekly DCF療法

| P | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day15 | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1 | | | | | | | | | | |
| 8 | 静注(ワンショット) | フペミト [®] (フシックス後発)注20mg「武田テバ [®] 」2mL 療法名:biweekly DCF療法 静脈内注射(ワンショット): 投与経路確保 末梢サブルート1 | 1A | | | | | | | | | |
| 9 | 点滴静注 | ゲン [®] 輸液 500mL バック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1 | 500mL | | | | | | | | | |
| 0 | 点滴静注 | ソルテ [®] M1 輸液500mL K C L 注20mEqキット「テルモ」 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL 10mL | | | | | | | | | |
| 1 | 点滴静注 | (化)5-FU注※ ソルテ [®] M3A 輸液500mL 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 500mL | | | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 | ゲン [®] 輸液 500mL バック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1 | 500mL | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 | ソルテ [®] M3A 輸液500mL 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 500mL | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 | (化)5-FU注※ ソルテ [®] M3A 輸液500mL | 0mg 500mL | | | | | | | | | |
| | <次ページあり> | | | | | | | | | | | |

三内科

レジメン名称 : biweekly DCF療法

| P | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day15 | | | | | | |
|----|------|---|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢サブルート1 | | | | | | | | | |
| 5 | 点滴静注 | デキスト注射液(デカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート2 | 6.6mg 100mL | | | | | | | | |
| 6 | 点滴静注 | 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 250mL | | | | | | | | |
| 7 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 100mL | | 投与順 1 | | | | | | |
| 18 | 点滴静注 | デキスト注射液(デカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 6.6mg 100mL | | 投与順 2 | | | | | | |

| RP | オーダーコメント |
|----|---------------------------------|
| 01 | ルートキープ (シスプラチン投与終了まで・残破棄可) |
| 09 | シスプラチン投与終了後からのメイン 100ml/hで流す |
| 10 | シスプラチン投与終了後、すぐに開始 |
| 12 | 100ml/hで流す 日付が変わったら残破棄可 |
| 16 | ルートキープ |
| 17 | ルートキープ |