

三内科

レジメン名称: CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】

レジメン説明: 2022/3/31承認

適用条件:

除外条件:

表面積計算式: 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

IC計算式: 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

IP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	70mg/m2		73.5mg/m2
00	点滴静注	(化)5-FU注※	350mg/m2		367.5mg/m2
01	点滴静注	(化)5-FU注※	350mg/m2		367.5mg/m2

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ゲイノール輸液 500mL パック 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL		投与順 2						
03	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	パロセトロン(アロキシ後発)静注0.75mg/5mL 「タイバ」 デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注:	500mL 10mL 8mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

第三内科

レジメン名称 : CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1									
13	点滴静注	カルダ3A 輸液500mL 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			4回					
14	点滴静注	テキアト注射液(テカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート2	6.6mg 100mL			1回	1回	1回			
15	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL				1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ (シスプラチン投与終了までのメイン・残破棄可)
08	シスプラチン投与終了後からのメイン 100ml/hで流す
09	シスプラチン投与終了後、すぐに開始
12	100ml/hで流す 日付が変わったら残破棄可
15	ルートキープ