

三内科

レジメン名称: Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP)

レジメン説明: 2022/3/31承認

適用条件:

除外条件:

表面積計算式: 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

IC計算式: 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

IP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
5	点滴静注	(化)キイトルグ点滴静注※	200mg		200mg
7	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	80mg/m2		84mg/m2
1	点滴静注	(化)5-FU注※	400mg/m2		420mg/m2
2	点滴静注	(化)5-FU注※	400mg/m2		420mg/m2

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
1	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1					
2	点滴静注	ゲンシド輸液 500mL パック 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL		投与順 2					
3	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 3					
4	点滴静注	パロセトロン(アロキシ後発)静注0.75mg/5mL 「タイ紡」 デキスト注射液(デカト後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 4					
5	点滴静注	(化)キイトルグ点滴静注※ 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: <次ページあり>	0mg 50mL		投与順 5					

三内科

レジメン名称 : Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP)

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1								
6	点滴静注	カルテ [®] Δ1 輸液500mL K C L 注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 6					
7	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 7					
8	静注(ワンショット)	フオセト [®] (ラシックス後発)注20mg「武田チバ」2mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 静脈内注射 (ワンショット): 投与経路確保 末梢サブルート1	20mg		投与順 8					
9	点滴静注	グ [®] イ [®] ND輸液 500mL バッグ 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 9					
10	点滴静注	カルテ [®] Δ1 輸液500mL K C L 注20mEqキット「テルモ」 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10					
11	点滴静注	(化)5-FU注※ カルテ [®] Δ3A 輸液500mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順11	1回	1回	1回	1回	
12	点滴静注 <次ページあり>	(化)5-FU注※	0mg		投与順12	1回	1回	1回	1回	

第三内科

レジメン名称 : Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		カルテム3A 輸液500mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL							
13	点滴静注	カルテム3A 輸液500mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順13					
14	点滴静注	カルテム3A 輸液500mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			4回				
15	点滴静注	テキソト注射液(テカト後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート2	6.6mg 100mL			1回	1回	1回	1回	
16	点滴静注	生理食塩液 250mL ソトパック 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL				1回	1回	1回	1回

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ (シスプラチン投与終了までのメイン・残破棄可)
05	0.2~5μmのフィルター使用
09	シスプラチン投与終了後からのメイン 100ml/hで流す
10	シスプラチン投与終了後、すぐに開始
13	100ml/hで流す 日付が変わったら残破棄可
16	ルートキープ