



三内科

レジメン名称: サイラムサ® 【8mg/kg】 + FOLFIRI

| P  | 手技     | 薬剤名称   | 用量/単位        | 処方1回量 | Day1  | Day2 | Day3 |  |  |  |
|----|--------|--|--------------|-------|-------|------|------|--|--|--|
| 5  | 中心静脈注射 | (化)ホホリナト点滴静注用※「ヤルト」<br>大塚糖液 5% 250mL ツトバッグ<br>療法名: サイラムサ® 【8mg/kg】 + FOLFIRI<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間 2時間で<br>投与経路: CVサブルート2 | 0mg<br>250mL |       | 投与順 5 |      |      |  |  |  |
| 16 | 中心静脈注射 | (化)5-FU注※<br>生理食塩液 50mL プラボトル<br>療法名: サイラムサ® 【8mg/kg】 + FOLFIRI<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間 5分で<br>投与経路: CVサブルート1               | 0mg<br>50mL  |       | 投与順 6 |      |      |  |  |  |
| 17 | 中心静脈注射 | (化)5-FU注※<br>生理食塩液 50mL プラボトル<br>療法名: サイラムサ® 【8mg/kg】 + FOLFIRI<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間 46時間で<br>投与経路: CVルートメイン1            | 0mg<br>150mL |       | 投与順 7 |      |      |  |  |  |
| 18 | フラッシュ  | ロック用生食注シリンジ 10mL 「ホホカ」<br>療法名: サイラムサ® 【8mg/kg】 + FOLFIRI<br>フラッシュ:   | 1本           |       | 1回    |      | 1回   |  |  |  |

| RP | オーダーコメント  |
|----|---|
| 01 | ルートキープ  |
| 03 | ・ 0.22 μmのフィルター使用<br>・ 全量250mL<br>・ 忍容性がよければ2回目以降30分まで短縮可 |
| 04 | ホホリナトと同時投与  |
| 05 | ホホテシと同時投与   |
| 07 | 全量150mL。インフューザーポンプ使用                                      |