

## 第一外科 【末梢】

レジメン名称： S-1 + CDDP + トセタキセル【イメド内服】

レジメン説明： 2015移行により生成  
 2017/8/23 DOC (アルコールフリー) へ変更  
 2018/7/20 フロセミド「テバ」→「武田テバ」の変更に伴い修正  
 2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件： CDDP、DOCはday1に投与

&lt;S-1&gt;

★80mg/m<sup>2</sup>/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→2週休薬

除外条件：

体表面積計算式： 男性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式： 男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※	40mg/m <sup>2</sup>		42mg/m <sup>2</sup>
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	60mg/m <sup>2</sup>		65mg/m <sup>2</sup>

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名：S-1 + CDDP + トセタキセル【イメド内服】 点滴静注： *点滴速度 80m l/hr 投与経路：末梢ルートメイン1	500mL		4回	2回	4回				
02	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 大塚食塩注10% 20mL 療法名：S-1 + CDDP + トセタキセル【イメド内服】 点滴静注： *点滴時間 3時間で 投与経路：末梢ルートメイン1	500mL 20mL			2回					
03	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ アロキソ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名：S-1 + CDDP + トセタキセル【イメド内服】 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL			1回					
04	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名：S-1 + CDDP + トセタキセル【イメド内服】 点滴静注： <次ページあり>	0mg 250mL			1回					

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : S-1 + CDDP + トセタキセル【イメント内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
		*点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									
05	静注(ワンショット)	フオセト (テシックス後発)注20mg「武田テバ」 2mL 生理食塩液 20mL プランプル 療法名:S-1 + CDDP + トセタキセル【イメント内服】 静脈内注射 (ワンショット) : 投与経路確保 末梢サブルート1	20mg 20mL			1回					
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:S-1 + CDDP + トセタキセル【イメント内服】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL			1回					
07	点滴静注	テキアト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:S-1 + CDDP + トセタキセル【イメント内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL				1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
05	CDDPの投与前