

## 第一外科 【末梢】

レジメン名称：胃癌 SOX療法

レジメン説明：2015移行により生成  
 2017年12月28日診療科より依頼有りホアブ<sup>レ</sup>カト追加（デキサメタゾン半量）  
 2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件：&lt;S-1&gt;

★80mg/m<sup>2</sup>/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

除外条件：

体表面積計算式：男性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルプラト後発)点滴静注液「NK」※	100mg/m <sup>2</sup>		105mg/m <sup>2</sup>

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名：胃癌 SOX療法 点滴静注： *点滴速度 100m l /hr 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイマド点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名：胃癌 SOX療法 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml アロキソ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名：胃癌 SOX療法 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	3.3mg 5mg 1V 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルプラト後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名：胃癌 SOX療法 点滴静注： *点滴時間 120分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

インターバル日数： 21 日

基準日： Day 1

最大クール数： 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称： 胃癌 SOX療法

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	オキサリプラチン投与1時間以上前に投与開始