

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : アブラキサン療法 胃癌

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg	260mg/m2		273mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:アブラキサン療法 胃癌 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:アブラキサン療法 胃癌 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:アブラキサン療法 胃癌 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	フィルターを通さないこと