

第一外科 【末梢】

レジメン名称：PTX(パクリ) + CDDP 単独療法

レジメン説明：2015移行により生成
 2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正
 2019/9/26 サンタック→カスターへ変更

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式：男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	80mg/m ²		100mg/m ²
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	25mg/m ²		40mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名：PTX(パクリ) + CDDP 単独療法 点滴静注： *点滴速度 100m l /hr 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL フェセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名：PTX(パクリ) + CDDP 単独療法 点滴静注： *点滴時間 5分で 投与経路：末梢サブルート1 全開で滴下	13.2mg 5mg 20mg 0.3mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名：PTX(パクリ) + CDDP 単独療法 点滴静注： *点滴時間 90分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名：PTX(パクリ) + CDDP 単独療法 点滴静注： *点滴時間 90分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4						

インターバル日数：7日

基準日：Day 1

印刷日時：2020-06-04 13:35:29

最大クール数：0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称：PTX(パクリ) + CDDP 単独療法

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	パクリタセル投与30分前に
03	0.22 μ m以下のフィルター使用