

第一外科

【末梢】

レジメン名称：PTX(パクリ)療法

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day15 | | | | | | |
|----|------|---|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PTX(パクリ)療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1 | 100mL | | 投与順 1 | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | デキスト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL ラモセトン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:PTX(パクリ)療法 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1 全開で滴下 | 13.2mg 5mg 20mg 0.3mg 50mL | | 投与順 2 | | | | | | |
| 03 | 点滴静注 | (化)パクリタセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名:PTX(パクリ)療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 250mL | | 投与順 3 | | | | | | |

| RP | オーダーコメント |
|----|------------------|
| 01 | ルートキープ |
| 02 | パクリタセル投与 30分前に |
| 03 | 0.22μm以下のフィルター使用 |