

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : CPT 1 1 単独療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)トポテシン点滴静注※	50mg/m2		100mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: CPT 1 1 単独療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: CPT 1 1 単独療法 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1 全開で滴下	6.6mg 5mg 0.3mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)トポテシン点滴静注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名: CPT 1 1 単独療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	キープ
02	トポテシン投与30分前に