

インターバル日数 : 7 日 基準日 : Day 1

第一外科 【末梢】 レジメン名称 : DTX(ドセ)単独療法

レジメン説明 : 2015移行により生成
 2017/8/23 DOC (アルコールフリー) へ変更
 2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正
 2019/9/26 サンタック→カスターへ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ドセタキセル点滴静注「EE」※	35mg/m2		50mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:DTX(ドセ)単独療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:DTX(ドセ)単独療法 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1 全開で滴下	13.2mg 5mg 20mg 0.3mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ドセタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:DTX(ドセ)単独療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	ドセタキセル投与30分前に