

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : 【初回】 Cap + CDDP + Tmab 【イメト[®]内服】

レジメン説明 : 2015移行により生成
 2018/7/20 フロセド[®]「テハ」→「武田テハ」の変更に伴い修正
 2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 : <カ[®]シタリン>★2,000mg/m²/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ハセブ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg
06	点滴静注	(化)シス [®] チン点滴静注「マルコ」※	80mg/m ²		84mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
01	点滴静注	ソルテ [®] ム3A 輸液500mL 療法名:【初回】Cap + CDDP + Tmab 【イメト [®] 内服】 点滴静注: *点滴速度 80m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		4回	2回	4回				
02	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ソフトバ [®] ッグ 大塚食塩注10% 20mL 療法名:【初回】Cap + CDDP + Tmab 【イメト [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 20mL			2回					
03	点滴静注	(化)ハセブ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラホ [®] トル 療法名:【初回】Cap + CDDP + Tmab 【イメト [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL			1回					
04	点滴静注	テキサ [®] ト注射液(テカ [®] ト [®] 後発)※ アロキ [®] 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:【初回】Cap + CDDP + Tmab 【イメト [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL			1回					
05	静注(ワンショット) <次ページあり>	フロセド [®] (ラシックス後発)注20mg「武田テハ」 2mL	20mg			1回					

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : 【初回】 Cap + CDDP + Tmab 【イメド[®]内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
		生理食塩液 20mL プラアンブル 療法名: 【初回】 Cap + CDDP + Tmab 【イメド [®] 内服】 静脈内注射 (ワンショット) : 投与経路確保 末梢サブルート1	20mL								
06	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名: 【初回】 Cap + CDDP + Tmab 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL			1回					
07	点滴静注	デキサト注射液(デカト [®] ロ [®] ン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【初回】 Cap + CDDP + Tmab 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL				1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
04	CDDPの投与前30分
05	CDDPの投与前

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : 【2回目以降】 Cap + CDDP + Tmab 【イメト[®]】

レジメン説明 : 2015移行により生成

2018/7/20 フロセド[®]「テハ」→「武田テハ」の変更に伴い修正

2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 : <カ[®]シタ[®]ビン>★2,000mg/m²/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ハセブ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※	6mg/kg		6.3mg/kg
06	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※	80mg/m ²		84mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
01	点滴静注	ソルテ [®] 43A 輸液500mL 療法名: 【2回目以降】 Cap + CDDP + Tmab 【イメト [®] 】 点滴静注: *点滴速度 80m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		4回	2回	4回				
02	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ソフトバ [®] ッグ [®] 大塚食塩注10% 20mL 療法名: 【2回目以降】 Cap + CDDP + Tmab 【イメト [®] 】 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 20mL			2回					
03	点滴静注	(化)ハセブ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボ [®] トル 療法名: 【2回目以降】 Cap + CDDP + Tmab 【イメト [®] 】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL			1回					
04	点滴静注	デキ [®] カート注射液(デ [®] カト [®] ロン後発)※ アロキ [®] 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【2回目以降】 Cap + CDDP + Tmab 【イメト [®] 】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL			1回					
05	静注(ワンショット) <次ページあり>	フロセド [®] (ラシックス後発)注20mg「武田テハ [®] 」 2mL	20mg			1回					

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【未梢】

レジメン名称 : 【2回目以降】 Cap + CDDP + Tmab 【イメド[®]】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
		生理食塩液 20mL プラアンプル 療法名: 【2回目以降】 Cap + CDDP + Tmab 【イメド [®] 】 静脈内注射 (ワンショット) : 投与経路確保 末梢サブルート1	20mL								
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名: 【2回目以降】 Cap + CDDP + Tmab 【イメド [®] 】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL			1回					
07	点滴静注	デキサト注射液(デカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【2回目以降】 Cap + CDDP + Tmab 【イメド [®] 】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL				1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
04	CDDPの投与前30分
05	CDDPの投与前