

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : 【初回】 S-1 + CDDP + T-mab 【イント[®]内服】

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/7/20 フロゼド[®]「テハ」 → 「武田テハ」の変更に伴い修正
2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 : ★CDDPはday1に投与

<S-1>
★80mg/m²/日を1日2回に分けて服用
★2週投与→1週休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ハセプ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg
06	点滴静注	(化)シスプ [®] ラチン点滴静注「マルコ」※	60mg/m ²		63mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
01	点滴静注	ソルデ [®] 43A 輸液500mL 療法名:【初回】 S-1 + CDDP + T-mab 【イント [®] 内服】 点滴静注: *点滴速度 80m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		4回	2回	4回				
02	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ソフトバ [®] ック [®] 大塚食塩注10% 20mL 療法名:【初回】 S-1 + CDDP + T-mab 【イント [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 20mL			2回					
03	点滴静注	(化)ハセプ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL フラボ [®] トル 療法名:【初回】 S-1 + CDDP + T-mab 【イント [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL			1回					
04	点滴静注	デキサ [®] 注射液(デ [®] カト [®] 後発)※ アロキ [®] 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:【初回】 S-1 + CDDP + T-mab 【イント [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で	9.9mg 0.75mg 100mL			1回					
	<次ページあり>										

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : 【初回】 S-1 + CDDP + T-mab 【イメド[®]内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
		投与経路:末梢サブルート1									
05	静注(ワンショット)	フオセミド [®] (テシックス後発)注20mg「武田テバ [®] 」2mL 生理食塩液 20mL フラソプル 療法名:【初回】S-1 + CDDP + T-mab 【イメド [®] 内服】 静脈内注射(ワンショット): 投与経路確保 末梢サブルート1	20mg 20mL			1回					
06	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトハック [®] 「テルモ」 療法名:【初回】S-1 + CDDP + T-mab 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL			1回					
07	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:【初回】S-1 + CDDP + T-mab 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL				1回	1回	1回		
08	点滴静注	テ [®] キアト注射液(テ [®] カト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:【初回】S-1 + CDDP + T-mab 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL				1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
04	CDDPの投与前30分
05	CDDPの投与前
07	ルートキープ

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : 【2回目以降】 S-1 + CDDP +T-mab 【イメト[®]】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
		投与経路:末梢サブルート1									
05	静注(ワンショット)	フロセイト [®] (ラシックス後発)注20mg「武田テバ [®] 」2mL 生理食塩液 20mL フ [®] ラアンプル 療法名:【2回目以降】 S-1 + CDDP +T-mab 【イメト [®] 】 静脈内注射(ワンショット): 投与経路確保 末梢サブルート1	20mg 20mL			1回					
06	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバ [®] ッグ「テルモ」 療法名:【2回目以降】 S-1 + CDDP +T-mab 【イメト [®] 】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL			1回					
07	点滴静注	テ [®] キサト注射液(テ [®] カト [®] ロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:【2回目以降】 S-1 + CDDP +T-mab 【イメト [®] 】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL				1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
04	CDDPの投与前30分
05	CDDPの投与前